AVALIAÇÃO DO RISCO DE ÚLCERA DE PRESSÃO NO DOENTE COM QUEIMADURAS

Fernando Miranda; Andreia Nobre

Irene Oliveira; Paulo Alves

Resumo:

O foco Úlcera de Pressão (UP) é um indicador de qualidade de cuidados de enfermagem, tornando-se urgente o estabelecimento de directrizes e protocolos de actuação na sua prevenção. A magnitude da UP nos doentes queimados é desconhecida e existe falta de suporte bibliográfico na caracterização e implementação de intervenções adaptadas que permitam preveni-las. As pessoas com mobilidade reduzida, são consideradas de alto risco no desenvolvimento de UP. A pessoa alvo de queimadura por si só, possui alteração na mobilidade, sem referir todos os outros factores de risco que a predispõe ao desenvolvimento de UP. A literatura diz-nos que estes podem ser intrínsecos, extrínsecos ou exacerbantes.

É premente conhecer quais as particularidades de cada indivíduo, neste caso alvo de queimadura. Só assim será possível direccionar as intervenções aos factores que realmente influenciam o aparecimento de UP, no doente com queimadura. Considera-se fulcral a criação de um instrumento, que correctamente utilizado, ajude na avaliação de risco de UP.

No decurso do Estágio em Cuidados Intensivos numa Unidade de Queimados, tendo por base a bibliografia existente, foi construído um instrumento de colheita de dados, que congregou a informação existente na literatura dos factores de risco no aparecimento de UP no doente queimado. Este irá permitir uma posterior análise multi-variáveis, dos factores de maior risco para o aparecimento de UP na pessoa com queimadura, para proporcionar um planeamento mais precoce das intervenções, com o objectivo de evitar a UP.