

# XIII

## PAN AMERICAN NURSING RESEARCH COLLOQUIUM

“Global Nursing Research Challenges for the Millennium”



**Presentation Abstracts  
Resúmenes de las Presentaciones  
Resumos das Apresentações**

ISBN No. 978-0-615-67489-6

**September 2-7, 2012**

**Miami, Florida, USA**

# Abuso de Substâncias

## B10

### “Consequências da Dependência de Substâncias”: um Contributo para a Validação do Resultado Noc

**Paulo Seabra**

Universidade Católica Portuguesa

**Luis Octávio Sá, PhD, UCP, Porto, Portugal;**

**José Amendoeira, PhD, UCP, Lisboa, Portugal**

**Introdução:** A avaliação dos resultados em saúde obtidos pelas pessoas quando cuidadas por enfermeiros, é determinante para evidenciar o contributo das nossas intervenções. Cada “resultado” é composto por determinados indicadores que podem ser mensurados ao longo do tempo, face à sensibilidade aos cuidados de enfermagem. O resultado da Nursing Outcome Classification (NOC) “Consequências da dependência de substâncias” poderá ajudar no processo de cuidar pessoas dependentes de drogas. Precisamos de validar o seu conteúdo teórico, para depois validar na clínica. Não encontramos evidência desta validação na literatura, além do estudo original. Vai permitir melhorar a qualidade dos cuidados.

**Objetivos:** Validar o conteúdo do resultado da NOC “consequências da dependência de substâncias”, com pessoas policonsumidoras em programa de manutenção opiácea com metadona. Específicos: Integrar novos indicadores de acordo com a literatura. Determinar quais os indicadores principais, secundários e os irrelevantes para o constructo deste resultado. Contribuir para um instrumento eficiente na avaliação da sensibilidade aos cuidados.

**Métodos:** Estudo quantitativo, transversal, segundo o modelo de Fehring. Começamos com informantes iniciais e recorremos ao método de “bola de neve”. Enviamos pela web 17 questionários e recebemos 13. Os peritos eram incluídos se tivessem os critérios. Os peritos atribuíam importância aos indicadores e apurou-se a média ponderada.

**Resultados:** O “resultado” tinha 16 indicadores, acrescentamos 12 com base na literatura. Foram eliminados 4, ficando o questionário final com 24 indicadores, 10 com valores > 0,80 (principais) e 14 com valores >0,50 e <0,80 (secundários).

**Conclusões/Implicações:** Os indicadores acrescentados tiveram maior concordância dos peritos, 8 como principais e 4 como secundários. Evidenciaram que os consumos de drogas têm maiores consequências a nível psicossocial e que, os cuidados de enfermagem podem atender a múltiplas necessidades. Dos indicadores iniciais da NOC, foram excluídos 4 (< 0,50) e apenas 2 classificados como principais. O estudo demonstra a fragilidade do resultado NOC e estimula a necessidade da sua validação clínica. Recomenda-se a aplicação numa amostra alargada de policonsumidores. Consideramos que permitirá uma prática de cuidados mais sistematizados e mais atentos às necessidades em saúde desta população. Salientamos os indicadores de saúde mental e de qualidade de vida.